

Сигналізаційне повідомлення №2
від 11.04.2018 р.

Встановлення теплої погоди з по-справжньому літніми температурами надзвичайно сприяє виходу з місць зимівлі садових довгоносиків, активному заселенню ними плодкових дерев та пошкодженню вегетативних (бруньки, листя), а з появою – і генеративних органів. Обстеженнями встановлено заселення **сірим бруньковим довгоносиком**, якого нараховується 5-6 екз./дерево. По строках сірий брунькоїд з'являється першим, згодом виходитимуть **яблуневий квіткоїд, букарка, казарка, інші**. За температурного режиму, що складається, це може проходити дуже швидко та інтенсивно і може призвести до істотних пошкоджень плодкових, зокрема, **яблуневим квіткоїдом**, одна самиця якого здатна відкласти 30-100 яєць в бутони груші, яблуні, глоду. Личинки, що відроджуються, в процесі живлення цілком їх знищують.

В зв'язку з вищенаведеним, цієї весни слід постійно обстежувати сади на наявність заселення садовими довгоносиками та їх шкідливість. *В разі встановлення перевищення економічних порогів шкідливості (сірого брунькового довгоносика - 3-5 жуків на 1 м гілок, букарки - 30-40 жуків на дерево, казарки – 7-9 жуків на дерево, яблуневого квіткоїда - 30-40 жуків на дерево при струшуванні або 10-15% пошкоджених бруньок), необхідно проводити обприскування дозволеними до використання в Україні інсектицидами: Актара 240SC, к.с. - 0,14 -0,15 л/га, Бі-58 новий, к.е., Біммер, к.е., 0,8-2,0 л/га, Воліам Флексі 300 SC, КС, - 0,3-0,5 л/га, Дантон 50, ВГ- 0,07 кг/га, Децис f-Люкс 25 ЕС, КЕ – 0,5-1 л/га, Енжіо 247 SC, к.с. - 0,18 л/га, Калінсо 480 SC - 0,2-0,25 л/га, Конфідор 200SL, в.р.к - 0,2-0,3 л/га, Пірінекс Супер 420, к.е. – 1,25-1,5 л/га, Пірінекс 25, СК, 3-3,5 л/га, іншими, суворо дотримуючись регламентів їх використання та вимог охорони праці й навколишнього середовища.*

Для обробітку **садів приватного сектору** дозволені препарати для роздрібного продажу населенню – Актара 240SC, к.с. (1,5 мл на 8-10 л води на 1 сотку), Енжіо 247SC, к. с.(1,8 мл на 5 л води), Інспектор, ВГ (1 г/10-14 л води), Калінсо 480SC, КС (2 мл/10 л води на 1 сотку).

Начальник управління
фітосанітарної безпеки



В.Л. Бажановський

Начальник відділу прогнозування,
фітосанітарної діагностики та
аналізу ризиків



В.А.Телефус