



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Келецька, 53, м. Вінниця, 21027, тел. (0432) 65-91-50, 65-86-70
web: www.vingudpss.gov.ua, e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

№ _____ на № _____ від _____

**Відділ захисту рослин Департаменту
фітосанітарної безпеки та контролю в
рослиництві Держпродспоживслужби України
Департамент агропромислового розвитку
Вінницької ОВА
Вінницький обласний центр з гідрометеорології**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №6
щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
у господарствах Вінницької області станом на 11 червня 2026 року**

Фенологія культур

Озима пшениця –	колосіння - цвітіння	Озимий ячмінь –	кінець цвітіння – молочна стиглість
Ярий ячмінь -	колосіння	Озимий ріпак –	закінчення цвітіння
Горох -	цвітіння	Кукурудза –	7-11 справжній листок
Соняшник –	4 пара справжніх листків	Цукрові буряки –	6-7 пара справжніх листочків
Соя –	2-5 трійчастий листок	Плодові –	припинення росту пагонів у довжину, ріст плодів
Картопля	бутонізація – початок цвітіння		

Кліматичні умови (за даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології)

Протягом першої декади червня на Вінниччині переважала нестійка погода. Опади відмічалися різної інтенсивності та кількості, з грозами. Добовий максимум опадів в центральних районах області склав 45-48 мм, що відповідає двом декадним нормам.

Сонячне сяйво до поверхні землі надходило протягом 67 годин, при нормі 98 годин.

Середня декадна температура повітря склала 17,1-18,4° тепла, що в межах норми.

Спостерігалися значні коливання середніх добових температур повітря та перепади температури упродовж доби.

Опади випадали протягом 5-6 днів і їх розподіл по території області був нерівномірний. Кількість опадів в центральних та південних районах області склала 53-88 мм, або 184-338 % від норми. На решті території області 22-44 мм, або 112-210 % від норми, в північних районах області до 20 мм, або 80% від норми.

Відносна вологість повітря становила 74-78 %, при нормі 68-70%.

Фазовий розвиток сільськогосподарських культур проходить в строки близькі до середньобогаторічних.

Зниження нічних температур повітря на початку червня пригнічувало ростові процеси теплолюбних культур і городини.

Вкрай нерівномірні літні дощі у вигляді злив та гроз місцями призвели до механічного пошкодження рослин, локального полягання, замулення та змивання посівів.

Помірно тепла погода та надлишок вологи сприяли інтенсивному росту бур'янів, розповсюдженню с/г шкідників та хвороб.

Початок червня збігається із найбільшою потребою в волозі ярих зернових культур, отже подальше формування колосу та налив зерна буде проходити при достатній місцями надлишковій вологозабезпеченості.

Сума ефективних температур вище +5° станом на 10 червня становила 549-651°, що в межах норми, вище +10° становила 229-273°, при нормі 235-307°, вище +15° склала 62-93°, при нормі 33-73°.

Відмічається надмірне осипання плодів кісточкових та сім'ячкових культур.

В центральних районах області (АМСЦ Вінниця, М Жмеринка та АМП Тульчин) 06-07 червня кількість опадів склала 67-81 мм, тому відмічається перезволоження верхніх шарів ґрунту.

На решті території області станом на 8 червня запаси продуктивної вологи під озимою пшеницею в орному шарі ґрунту становили 21-57 мм, в метровому 65-249 мм (від недостатніх до надлишкових).

Багатоїдні шкідники

Продовжується літ **листогризучих та підгризаючих совок**: за ніч на світлопастку потрапило 2 екз. **озимої совки**, 5 екз. **окличної совки** та 2 екз. **капустяної совки**.

Шкідники та хвороби зернових культур

На 100% обстежених площ **озимої пшениці** спостерігається заселеність **трипсами, попелицями та п'явицями**: пшеничним трипсом заселено 2 % рослин з чисельністю 4 екз. на заселену рослину, личинки злакової попелиці, що продовжують відродження, спостерігаються на 1% рослин з чисельністю 12, максимально - 16 екз. на заселену рослину; личинок п'явиці нараховується 0,3, максимально 0,5 екз. на кв.м. **Клоп-шкідлива черепашка** спостерігається на 55% площ у кількості 0,1 екз./м².

На усіх площах відмічається розвиток **борошнистої роси та септоріозу**: рівень ураження рослин борошнистою россою становить 4-5% рослин, септоріозом 6 максимально 7% рослин, розвиток хвороб становить 0,2-0,3%. На 63% площ відмічено бура листкова іржа на 1% рослин.

При обстеженні в приватному секторі посівів **озимого ячменю** (площа 10 га) було виявлено ураженість рослин **гельмінтоспоріозом** 6 % рослин в слабкому ступені, **борошнистою россою** 3 % рослин. Також було відмічено заселеність посівів **п'явицею** у кількості -0,4 екз. на кв.м., **хлібних жуків** нараховується 0,2 екз. на кв.м. Продовжується відродження личинок **злакової попелиці** — заселено 1% рослин з чисельністю 11 екз. на заселену рослину.

На посівах **кукурудзи** (площа обстеження 89 га) було виявлено заселеність **злаковою попелицею** 1 % рослин у кількості 3-5 екз./рослину.

Шкідники озимого ріпаку

У посівах **озимого ріпаку** (203 га) на 3% рослин нараховується 4 екз./рослину личинок **стеблового капустяного прихованохоботника**, ним пошкоджено 3% рослин у слабкому ступені. **Ріпаковий прихованохоботник** поширений у кількості 1

екз./стручок. Проходить заселення посівів **капустяною попелицею** – заселено 1% рослин з чисельністю 16 екз. на заселену рослину.

Шкідники соняшнику

При обстеженні посівів **соняшнику** (площа 209 га) було виявлено **заселення геліхрізовою попелицею** 1% рослин з чисельністю 9 екз. на заселену рослину, **клопів сліпняків** нараховується 0,2 екз./кв.м.

Шкідники картоплі

При обстеженні площ **картоплі** в приватному секторі с.Устя відмічено продовження заселення їх **колорадським жуком** – 2 екз. імаго на кущ, заселено 3% рослин, яйцекладками заселено 3% рослин з чисельністю 1 яйцекладки на рослину, личинок нараховується 22 екз.на кущ, заселено 3% рослин. Підготовлено та розміщено на сайті головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області сигналізаційне повідомлення щодо виходу личинок колорадського жука.

Ураження рослин **альтернаріозом** становить – 4% рослин, **фітофторозом** – 1 % рослин.

Шкідники та хвороби саду

В **плодових насадженнях** в приватному секторі с.Флорино (площа 12 га) продовжується відродження та заселення дерев **зеленою яблуневою попелицею** – нею заселено 2% листків по 16 личинок на листок. **Бурій плодовий кліщ** розвивається на 9% дерев, 5% листків, з чисельністю 2 личинки на листок. Продовжується літ **плодожерок**: на феромонну пастку потрапило 7 екз. за ніч **яблуневої плодожерки** та 14 екз. за ніч **сливової плодожерки**.

На яблунях спостерігається **парша**, ураження якою становить 6% дерев та 2% листків, а також **борошниста роса** на 8% дерев та 2% листків.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин у Вінницькій області
(1 декада червня 2026 року)

№ з/п	Назва культури	Обстежено, га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз (сер/макс).									Пошкоджено, (сисними – заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин, бруньок суцвіть, плодів	один. вимір	імаго		яйце		личинки			ентомофаги					
							серед.	макс.	серед.	макс.	серед.	макс.	вік		серед.	макс.			
1	Оз.пшениця	192	Клоп-шкідлива черепашка	55		екз./кв.м	0,1	0,1							1	1	100		
			Трипс пшеничний	100	2	екз./рослину					4	4			2	2	100		
			Попелиці	100	1	екз./рослину					12	16			1	1	100		
			П'явиці	100		екз./кв.м					0,3	0,5			3	3	100		
2	Оз.ячмінь	10	Кузька	100		екз./кв.м	2	2						1	1	100			
			Попелиці	100	1	екз./рослину					11	11			1	1	100		
			П'явиці	100		екз./кв.м					0,4	0,4			3	3	100		
3	Оз.ріпак	203	Капустяна попелиця	100	1	екз./рослину					16	16		1	1	100			
			Стебловий капустяний прихованохоботник	100	3	екз./рослину					4	4			3	3	100		
			Ріпаківий прихованохоботник	100	3	екз./плід					1	1			2	2	100		
4	Кукурудза	89	Попелиці	100	1	екз./рослину					3	5		1	1	100			
5	Соняшник	209	Попелиця геліхризова	47	1	екз./рослину					9	9		1	1	100			
			Сліпняки	100		екз./кв.м	0,2	0,2						1	1	100			
6	Картопля	1	Колорадський жук	200	3	екз./рослину	2	3	1	2	22	26		3	3	100			
7	Сад	12	Зелена яблунева попелиця	100	22	екз./листок					16	19		2	2	100			
			Кліщ бурий плодовий	100	9	екз./листок					2	2			5	5	100		

**Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин
(1 декада червня 2026 року)**

№ з/п	Назва культури	Обсте- жено, га	Назва хвороби	Уражено, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				площ	рослин		Назва ураж. органу	Органів рослин			
					середній	максим.		середній	максим.		
1	Оз.пшениця	192	Іржа бура листкова	63	1	1	листя			0,1	
			Борошниста роса	100	4	5	листя			0,2	
			Септоріоз	100	6	7	листя			0,3	
2	Оз.ячмінь	10	Борошниста роса	100	3	3	листя			0,2	
			Гельмінтоспоріоз	100	6	6	листя			0,3	
3	Картопля	1	Альтернаріоз	100	4	4	листя			0,2	
			Фітофтороз	100	1	1	листя			0,1	
4	Сад	12	Борошниста роса	100	8	8	листя	2	2	0,1	
			Парша	100	6	6	листя	2	2	0,1	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах
(1 декада червня 2026 року)**

№з/п	Назва культури	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення, %		Середня чисельність яєць на самку
		обстежено	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність, екз		самиці	самці	
							середня	максимальна			
1	Кукурудза	89	89	Совка озима	I	екз./ніч	2	2		100	
			89	Совка оклична	I	екз./ніч	5	12		100	
			89	Капустяна совка	I	екз./ніч	2	4		100	
2	Сад	12	12	Яблунева плодожерка	I	екз./ніч	7	7		100	
			12	Сливово плодожерка	I	екз./ніч	14	18		100	

**Начальник управління
фітосанітарної безпеки**

підписано

Наталія САМБОРСЬКА

Сергій ФРАНКОВ
(0432) 65-86-70