



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Келецька, 53, м. Вінниця, 21027, тел. (0432) 65-91-50, 65-86-70
web: www.vingudpss.gov.ua, e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

№ _____

на № _____

від _____

**Відділ захисту рослин Департаменту
фітосанітарної безпеки та контролю в
рослиництві Держпродспоживслужби України
Департамент агропромислового розвитку
Вінницької ОВА
Вінницький обласний центр з гідрометеорології**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №8
щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
у господарствах Вінницької області станом на 09 липня 2026 року**

Фенологія культур

Озима пшениця –	молочна стиглість	Ярий ячмінь –	початок виходу у трубку
Озимий ячмінь –	налив зерна визрівання	Кукурудза –	10-14 листків – початок викидання волоті
Соняшник –	утворення суцвіття	Цукрові буряки –	ріст коренеплодів
Озимий ріпак –	достигання	Картопля	цвітіння - стиглість
Соя –	цвітіння	Яблуня –	ріст плодів
		Багаторічні	відростання
		трави –	

Кліматичні умови (за даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології)

Третя декада червня на Вінниччині характеризувалася переважно сухою, сонячною погодою з підвищеним температурним режимом, в окремі дні сильною спекою.

Сонячне сяйво до поверхні землі надходило протягом 122 годин, при нормі 95 годин. Середня декадна температура повітря склала 22,8-24,8° тепла, що на 3,7-5,1° вище від норми.

Максимальна температура повітря підвищувалася до 34-38°. Кількість днів з температурою повітря +30° і вище склала 3-9. Мінімальна температура повітря в нічні години опускалася до 12-15°. Сума ефективних температур вище +5° станом на 30 червня становила 855-974°, при нормі 822-955°, вище +10° становила 434-497°, при нормі 408-513°, вище +15° склала 168-216°, при нормі 106-179°.

Розподіл опадів був нерівномірним: їх кількість в південно-східних та південних районах області склала 11-22 мм, або 47-73 % від норми. На решті території області 0,8-2 мм або 3-7 % від норми, місцями без опадів.

Відносна вологість повітря становила 62-68 % при нормі 70-73%.

На більшості площ достигання зерна ранніх колосових відбувалося при, переважно, задовільних умовах. Під дією високих температур повітря скоротився період наливу зерна, переважно без негативних наслідків, через порівняно високу вологість повітря (35-40%). В районах, де періодично проходили дощі, підтримувалося достатнє зволоження ґрунту, переважали сприятливі агрометеорологічні умови для росту та розвитку пізніх теплолюбних сільськогосподарських культур.

Багатоїдні шкідники

Стебловий кукурудзяний метелик. При обстеженні посівів кукурудзи на площі 526 га відмічено літ метеликів з чисельністю 1 екз. / 10 кроків на 46% площ. На сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області розміщено сигналізаційне повідомлення.

Підгризаючі совки. Відбувається заляльковування гусениць першого покоління та початок льоту метеликів II-го покоління: за ніч на світлопастку потрапив 1 екз. окличної совки.

Листогризучі совки. Продовжується літ листогризучих совок: на півдні області відмічено совка-гамма у кількості 1-2 екз./10 кр. на посівах цукрових буряків, за ніч вилову на світло пастку – 1-2 екз. капустяної совки.

Саранових на території області не виявлено.

Шкідники та хвороби озимих зернових

Посіви **озимої пшениці** обстежено на загальній площі 1454 га. Продовжують завдавати шкоди у слабкому ступені комплекс фітофагів: **злаковими попелицями** заселено 4% рослин з чисельністю в середньому 5, максимально 11 екз./рослину, пошкоджено 4, максимально 5% рослин; шкідливість **клопа шкідливої черепашки** та **елії гостроголової** становить на рівні 1 - 2% рослин за чисельності 0,2 – 0,3 екз./кв.м; **пшеничним трипсом** заселено та пошкоджено 2% рослин з чисельністю личинок 2-3 екз./колос; личинки **п'явиці** на 13% площ у кількості 0,4-0,5 екз./м² пошкодили 5-7% рослин.

В посівах продовжується розвиток хвороб: **піренофорозом** уражено в середньому 5, максимально 10% рослин, з розвитком хвороби 0,3% на 29% площ, з них колос – у 22% рослин. **Септоріоз** – на 10-22% рослин на 70% площ із розвитком хвороби 0,3%. **Борошниста роса** на 38% площ уразила 7-12% рослин, розвиток хвороби – 0,2%; **бура іржа** на 8% площ відмічена на 1-2% рослин із розвитком хвороби на рівні 0,1%.

У посівах **ярого ячменю** більш інтенсивного розвитку та поширення набув **гельмінтоспоріоз**, який уразив в середньому 5%, максимально 9% рослин за розвитку хвороби 0,2%. **Борошниста роса** на 54% виявлена у 3-7% рослин із розвитком хвороби – 0,2%. Також на 28% площ спостерігаються **клоп шкідлива черепашка** та **елія гостроголова** у кількості 0,1-0,2 екз./м², ними пошкоджено до 2% рослин; **попелиця** у кількості 5-9 екз./м² личинок пошкодила 3% рослин.

Шкідники та хвороби озимого ріпаку

У посівах озимого ріпаку (456 га) спостерігались: **ріпаковий прихованохоботник** у 4% рослин, чисельність – 2-5 екз./рослину, пошкоджено 4-8% рослин на 65% площ; **капустяною попелицею** заселено 2% рослин, пошкоджено 2-4% рослин з середньою чисельністю личинок 9, максимально 23 екз./рослину; **стручкова галиця** заселяє 2% рослин з чисельністю 9-15 личинок/рослину.

На 14% площ відмічено **альтернаріоз** на 2-5% рослин, розвиток хвороби складає 0,2%. **Фомозом** уражено 8-11% рослин на 17% площ із розвитком хвороби 0,2%.

Шкідники та хвороби цукрових буряків

Проведення постійного моніторингу та своєчасне проведення захисних заходів стримує розвиток **бурякової листкової попелиці**, якою охоплено 33% обстежених площ цукрових буряків (всього обстежено 150 га), заселено шкідником 2% рослин з чисельністю 5 - 9 екз./рослину. **Щитоносками** заселено та пошкоджено в слабкій ступені 2% рослин за чисельності 0,2-0,3 екз./кв.м.. **Совка гамма** за чисельності 0,3-0,5 екз./кв.м слабо пошкодила 2-3% рослин, **бурякова мінуюча муха** заселила та пошкодила 1-2% рослин, за чисельності 1-2 екз./рослину; личинками **бурякової мінуючої мухи** заселено 0,8 % рослин (південь області) із чисельністю личинок 1-2 екз./рослину.

Також на півдні було відмічено **фомоз** на 1% рослин.

Шкідники та хвороби соняшнику

В посівах соняшнику (1092 га) продовжується заселення та розвиток **геліхрислової попелиці**, якою заселено 2-3% рослин з чисельністю 10, максимально 25 екз./рослину. Незначної шкоди рослинам **соняшника** завдають **клопи сліпняки**, які за чисельності 1 екз./кв.м слабо пошкодили 1-2% рослин.

Фомозом уражено нижні листки рослин на 47% обстежених площ в середньому 3, максимально 5% рослин, з розвитком хвороби 0,2%, **переноспороз** проявився на 2% рослин, розвиток хвороби – 0,2%.

Шкідники сої

На площах під посівами сої проходить розвиток звичайного **павутинного кліща** та попелиць, якими на 10% обстежених площ заселено та пошкоджено 2% рослин з чисельністю 1-2 екз. **Акацієва вогнівка** відмічена на 6% площ на 2% рослин із чисельністю 0,2-0,3 екз./рослину.

Шкідники та хвороби овочів

В посадках **картоплі** продовжують свій розвиток **колорадські жуки**, які заселяють на 100% площ 23% рослин за чисельності 2 екз. імаго, 7 – 18 личинок на кущ, пошкоджено 12 – 26% рослин в слабкому ступені, 1% рослин в середньому ступені. **Альтернаріозом** та **фітофторозом** уражено 1 - 2% рослин на 15% площ з розвитком хвороби 0,1%.

На площах під **капостою** продовжується розвиток **попелиць**, якими заселено 4% рослин з чисельністю 5-16 екз./рослину. Як і в попередні роки розвиток та пошкодження **білокрилкою** стає все відчутнішим, **фітофагом** заселено та пошкоджено до 46% рослин, з чисельністю 10-26 екз. личинок/рослину.

У посівах **огірків** на 10% обстежених площ відмічено розвиток **переноспорозу** у 2% рослин, розвиток хвороби 0,1%, **бактеріоз** та **антракноз** розвиваються у 1-3% рослин, розвиток хвороби 0,1%.

В посадках **цибулі** інтенсивно проходить розвиток **пероноспорозу**, уражено 11-64% рослин, розвиток хвороби 0,1%.

Шкідники та хвороби саду

В **садах** продовжується літ метеликів **плодожерок**, відкладання яєць та виплоджування гусениць. В середньому за декаду яблуневої на світло пастку прилетіло 4, максимально 6 екз. за ніч. **Попелиці** заселяють 87% площ, 13% рослин з чисельністю в середньому 18, максимально осередками 68 екз./листок. **Бурій плодовий кліщ** заселив 71% площ, 12% дерев за чисельності 2-3 екз./листок. Відмічено пошкодження плодожеркою поодиноких плодів.

Продовжується розвиток **борошнистої роси**, якою охоплено 100% площ, 5-16% дерев, 4% листків з розвитком хвороби 0,2%, **паршею** уражено 77% площ, 2% листків, розвиток хвороби 0,2%, на плодах – 3%.

Шкідники багаторічних трав

В посівах **конюшини** продовжується розвиток фітофагів: **совка гама** за чисельності 0,3-0,5 екз./кв.м пошкодила 2% рослин, **стебловий довгоносик** з чисельністю 1-2 екз./кв.м та **конюшиновий насіннід** 1-2 екз. на 100п.с. в слабкій ступені пошкодили 2% рослин.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин у Вінницькій області
(1 декада липня 2026 року)

№ з/п	Назва культури	Обстежено, га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз (сер/макс).									Пошкоджено, (сисними – заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин, бруньок суцвіть, плодів	один. вимір	імаго		яйце		личинки			ентомо-фаги	серед.	макс.	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
							серед.	макс.	серед.	макс.	серед.	макс.	вік						
1	Оз.пшениця	1454	Шкідлива черепашка	38		екз./кв.м	0,2	0,3			0,2	0,2			1	2	100		
			Елія гостроголова	26		екз./кв.м	0,2	0,2			0,1	0,2			1	2	100		
			Трипси	51	2	екз./рослину	1	2			2	3			2	2	100		
			Попелиці	42	4	екз./рослину					5	11			4	5	100		
			П'явиці	13		екз./кв.м					0,4	0,5			5	7	100		
2	Яр.ячмінь	50	Шкідлива черепашка	28		екз./кв.м	0,3	0,3			0,1	0,2			1	2	100		
			Елія гостроголова	28		екз./кв.м	0,3	0,3			0,1	0,2			1	2	100		
			Попелиці	28	3	екз./кв.м	3	3			5	9			3	3	100		
3	Кукурудза	526	Попелиці	22	2	екз./рослину					5	11			1	2	100		
4	Оз.ріпак	456	Капустяна попелиця	89	2,5	екз./рослину	1	2			9	23			2	4	100		
			Ріпаковий прихованохоботник	65	4	екз./плід					1,6	5			4	8	100		
			Галиця капустяна стручкова	11	2	екз./рослину					9	15			2	2	100		
5	Цукрові буряки	150	Бурякова листкова попелиця	23	2	екз./кв.м					5	9			2	3	100		
			Бурякова листкова попелиця	33	1	екз./рослину					8	8			1	1	100		
			Щитоноска бурякова	33		екз./кв.м	0,2	0,2							2	2	100		
			Бурякова мінуоча муха	50	0,8	екз./рослину					1,3	2			1	2	100		

			Совка гамма	50	2	екз./кв.м					0,3	0,5			2	3	100		
			Щитоноска лободова	28		екз./кв.м	0,2	0,3							2	2	100		
6	Соняшник	1092	Попелиця геліхризова	56	1,8	екз./рослину	2	2			10	25			2	3	100		
			Сліпняки	41		екз./кв.м	0,8	1							1	2	100		
7	Соя	230	Звичайний павутинний кліщ	10	2	екз./листок					1	2			1	2	100		
			Акацієва вогнівка	6	2	екз./рослину					0,2	0,3			1	2	100		
			Попелиці	10	2	екз./рослину					2	2			1	2	100		
8	Картопля	2	Колорадський жук	100	23	екз./рослину	2	2	18	32	7	18			12	26	99	1	
9	Капуста	1	Капустяна попелиця	100	4	екз./рослину					5	16			4	7	100		
			Білокрилки	100	46	екз./рослину					10	26			28	46	100		
10	Сад	7	Зелена яблунева попелиця	87	13	екз./листок	1	2			18	68			5	18	100		
			Звичайний павутинний кліщ	16	10	екз./листок	1	1			2	3			4	10	100		
			Кліщ бурий плодовий	71	12	екз./листок					2	3			10	10	100		
11	Конюшина	52	Конюшинний насітнієд-апіон	100		екз./100 п.с.	1	2							2	2	100		
			Конюшинний стебловий довгоносик	100		екз./кв.м	1	2							2	2	100		
			Совка гамма	100		екз./кв.м					0,3	0,5			2	2	100		
			Сліпняки	100		екз./100 п.с.	2	2							2	2	100		

**Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин
(1 декада липня 2026 року)**

№ з/п	Назва культури	Обсте- жено, га	Назва хвороби	Уражено, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				площ	рослин		Назва ураж. органу	Органів рослин			
					середній	максим.		середній	максим.		
1	Оз.пшениця	1454	Іржа бура листкова	8	1	2	листя			0,1	
			Борошниста роса	38	7	12	листя			0,2	
			Септоріоз	70	10	22	колос(22%), листя(78%)			0,3	
			Піренофороз	29	5	10	листя			0,3	
2	Яр.ячмінь	50	Борошниста роса	54	3	7	листя			0,2	
			Гельмінтоспоріоз	100	5	9	листя			0,2	
3	Оз.ріпак	456	Альтернаріоз	14	2	5	листя			0,2	
			Фомоз	17	8	11	листя			0,2	
4	Соя	230	Аскохітоз	10	2	2	листя			0,2	
			Септоріоз	10	1	2	листя			0,2	
5	Цукрові буряки	150	Фомоз	33	1	1				0,1	
6	Соняшник	1092	Пероноспороз	40	2	2	листя			0,2	
			Фомоз	47	3	5	листя			0,2	
7	Картопля	2	Альтернаріоз	65	4	6	листя			0,2	
			Фітофтороз	15	1	2	листя			0,1	
8	Огірки	1	Антракноз	10	1	2	листя			0,1	
			Бактеріоз	10	1	3	листя			0,1	
			Пероноспороз	10	2	2	листя			0,1	
9	Томат	2	Альтернаріоз	100	9	9	листя			0,3	
			Фітофтороз	100	6	6	листя			0,2	
10	Цибуля ріпчаста	1	Пероноспороз	100	11	64	листя (91%)			0,1	
11	Сад	7	Борошниста роса	78	5	16	листя(57%), пагони(43%)	4	4	0,2	
			Парша	77	7	9	листя	2	2	0,2	
			Парша звичайна плодів	71	11	11	плоди			0,2	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах
(1 декада липня 2026 року)**

№з/п	Назва культури	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення, %		Середня чисельність яєць на самку
		обстежено	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність, екз		самиці	самці	
							середня	максимальна			
1	Кукурудза	526	241	Стебловий метелик	I	екз./10 кроків	1	1	100		
2	Цукрові буряки	150	50	Совка гамма	II	екз./10 кроків	1	1	100		
3	-	-	-	Совка озима	I	екз./ніч	1	2			
4	-	-	-	Совка оклична	I	екз./ніч	1	1			
5	-	-	-	Совка гамма	I	екз./10 кроків	1	2			
6	-	-	-	Капустяна совка	I	екз./ніч	1	2			
7	-	-	-	Яблунева плоджерка	I	екз./ніч	4	6			
8	-	-	-	Стебловий метелик	I	екз./ніч	1	2			
9	-	-	-	Білани	I-II	в п.з /1 хв.	3	4			

**Начальник управління
фітосанітарної безпеки**

підписано

Наталія САМБОРСЬКА

Сергій ФРАНКОВ
(0432) 65-86-70