



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Келецька, 53, м. Вінниця, 21027, тел. (0432) 65-91-50, 65-86-70
web: www.vingudpss.gov.ua, e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

№ _____

на № _____

від _____

**Відділ захисту рослин Департаменту
фітосанітарної безпеки та контролю в
рослиництві Держпродспоживслужби України
Департамент агропромислового розвитку
Вінницької ОВА
Вінницький обласний центр з гідрометеорології**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №9
щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
у господарствах Вінницької області станом на 23 липня 2026 року**

Фенологія культур

Озима пшениця –	воскова – повна стиглість	Кукурудза –	‘
Соняшник –	цвітіння	Цукрові буряки –	ріст коренеплодів
Соя –	цвітіння- формування бобів	Картопля	стиглість
		Яблуня –	визрівання плодів

Кліматичні умови (за даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології)

В другій декаді липня на Вінниччині спостерігалася нестійка погода із коливаннями температури повітря, з опадами різної інтенсивності з грозами, місцями з градом.

19 липня погода по Вінницькій області обумовлювалася циклоном над країнами Балтії. При проходженні атмосферного фронту з хвилями та його загостренням в другій половині дня по області пройшли помірні, значні, місцями сильні дощі, спостерігалися грози на всіх станціях області.

Сонячне сяйво до поверхні землі надходило протягом 93 годин, при нормі 91 годину.

Середня декадна температура повітря склала 20,0-22,6° тепла, що в межах норми, на півдні області на 1,2° вище норми. Максимальна температура повітря підвищувалася до 30-34°. Мінімальна температура повітря в нічні години 12 липня опускалася до 8-12°.

Станом на 20 липня сума ефективних температур вище +5° становила 1150-1308°, при нормі 1112-1279°, вище +10° становила 629-730°, при нормі 598-737°, вище +15° - 263-349°, при нормі 196-303°.

Розподіл опадів був нерівномірним. Їх кількість в центральних та південно-східних районах області склала 60-63 мм або 250-274 % від норми, на решті території області 17-35 мм або 63-117 % від норми, в південних районах області відповідно 2-11 мм або 7-39 % від норми.

Відносна вологість повітря становила 61-75 %, при нормі 71-73 %.

Багатоїдні шкідники

Мінливий гідротермічний режим негативно впливав на розвиток та літ кукурудзяного стеблового метелика, якого нараховується 1 екз. за ніч вилову на феромонну пастку. Яйцекладка фітофага виявляється місцями в посівах кукурудзи на 36% площ у 0,5% рослин, в кладці 15 яєць. Продовжується відродження

гусениць. Чисельність і шкідливість шкідника зростатиме за умов помірно-вологої погоди.

Відбувається малоактивний літ метеликів **совок II покоління: капустяної** – за ніч вилову на феромонну пастку становить 1 екз.; **совки-гамми** – за ніч вилову на феромонну пастку становить 2 екз.; метеликів **бавовникової совки** (1 екз. на 10 кроків на узбіччях полів). Прохолодна погода, особливо вночі, зливові дощі, грози негативно впливають на розвиток совок та інтенсивність їх льоту.

Шкідники та хвороби озимих зернових

На посівах **озимої пшениці** (обстежено 1040 га), в місцях, де рослини ще не досягли повної стиглості, відмічено заселеність 32% посівів **хлібними жуками**, за чисельності 0,2 екз./кв.м пошкоджено 1% рослин.

На колосі пшениці спостерігається **септоріоз** на 46% площ у 3%, максимально – 11% (на півдні області) рослин, розвиток хвороби – 0,2%. **Фузаріоз колосу** поширився на 8% обстежених площ у 0,2% рослин, розвиток хвороби 0,1%.

Шкідники та хвороби кукурудзи

У посівах **кукурудзи** (обстежено 1210 га) на 645% площ відмічалось поступове зростання чисельності та шкідливості **злакової попелиці** – фітофаг заселив 3-7% рослин, чисельність личинок складала 9-22 екз./рослину.

Відмічено початок розвитку **гельмінтоспоріозу**, яким уражено 24% обстежених площ, 1% рослин, розвиток хвороби – 0,1%. На 0,5% рослин відмічено **пухирчаста сажка** качанів кукурудзи.

Шкідники та хвороби соняшнику

При обстеженні посівів **соняшнику** (868 га) було виявлено заселення **геліхризовою попелицею** 61% площ, 3% рослин у чисельності личинок 13-31 екз./роsl., заселено 3-7% рослин. Чисельність ентомофагів – личинок сонечка, яких нараховується 2 екз./рослину. **Клопи-сліпняки** шкодять на 2-3% рослин за чисельності імаго 1-2 екз./кв.м.

Фомоз в посівах соняшнику набуває значної інтенсивності на 60% площ, спостерігається на 6-14% рослин за розвитку 0,2%. Менш інтенсивно розвивається **пероноспороз**, який уразив 3-5% рослин за розвитку 0,2%. **Біла гниль** повсюди спостерігається на стеблах 0,5% рослин. Поширенню хвороб соняшнику сприятимуть надмірні опади та температури 14-16°C.

Шкідники та хвороби сої

Посівам сої продовжують завдавати шкоди **попелиці** та **звичайний павутинний кліщ**, якими заселено та пошкоджено до 3% рослин, за чисельності кліщів – 2-3 екз./листок, попелиці – 2-3 екз./рослину.

Відмічено початок розвитку **альтернаріозу**, якими уражено 1-2% рослин, розвиток хвороби 0,1%, **аскохітозом** уражено 3-5% рослин, розвиток хвороби 0,2%, **септоріозом** – 3% рослин, розвиток хвороби – 0,2%.

Шкідники та хвороби цукрових буряків

На посівах цукрових буряків склалися сприятливі умови для розвитку **бурякової листкової попелиці** – заселено 45% площ на 3% обстежених рослин за чисельності 8 – 14 екз. на заселену рослину, пошкоджено в слабкій ступені 5-9% рослин. **Щитососками** за чисельності 0,3 екз./рослину, пошкоджено 3% рослин. **Совка гама** заселила 32% площ, пошкодивши 3% рослин з чисельністю 0,3 – 0,5 екз./кв.м.

Фомозом та **церкоспорозом** уражено 25% обстежених площ, 2-3% рослин, розвиток хвороб становить 0,1%.

Шкідники та хвороби овочів

В посадках картоплі та томатів продовжують шкодити **колорадські жуки** літнього покоління: на картоплі фітофагом заселено та пошкоджено 10 - 22% рослин в слабкому ступені за чисельності 2 імаго та 9-20 личинок на заселений кущ, в посадках томатів пошкоджено 2-3% рослин, за чисельності 1екз. імаго, 3-5 екз. личинок на заселену рослину. Відмічено дротяники у кількості 2 екз./кв.м та личиник озимої совки у кількості 0,1-0,2 екз./кв.м.

На рослинах картоплі продовжується розвиток **альтернаріозу** та **фітофторозу**: **альтернаріозом** уражено 5-10% рослин, розвиток хвороби 0,3%, **фітофторозом** 7-15% рослин, розвиток хвороби 0,3%.

Альтернаріоз відмічено на 6-11% рослин томатів, розвиток хвороби – 0,2%; **фітофторозом** уражено – 6-8% рослин, розвиток хвороби – 0,2%.

На посівах огірків продовжується розвиток **попелиць**, якими заселено 3% рослин з чисельністю 2-3 екз./імаго та 5 – 11 личинок/ листок. **Павутинним кліщем** заселено 10% обстежених площ, пошкоджено та заселено 2-3% рослин, 2-3 екз./листок.

Бактеріозом уражено 3-7% рослин, **пероноспорозом** - 4-5% рослин, **антракнозом** 2-3% рослин, розвиток хвороби 0,2%.

Посадки капусти заселено та пошкоджено в слабкій ступені **попелицею** 3% рослин за чисельності 9 – 18 екз. на рослину. На капусті продовжується літ **біланів**

та відродження гусениць, якими пошкоджено 2-3% рослин за чисельності 2-5 екз./рослину, **білокрилка** заселила 100% площ, за чисельності личинок 14-46 екз./рослину, **капустяна совка** заселила 1-2% рослин, чисельність 1-2 екз./рослину, **капустяною міллю** пошкоджено 2% рослин, за чисельності 2-3 екз./рослину.

Шкідники та хвороби саду

В **багаторічних насадженнях** продовжується шкодочинність **зеленої яблуневої попелиці**, якою заселено 11% дерев з чисельністю 18-35 екз./листок з пошкодженням 6-18% листків. **Яблуневою плодожеркою** заселено 5% дерев, пошкоджено 1% плодів (ранні сорти). **Кліщі** пошкодили 7-12% листків за чисельності 2-3 екз./листок.

Борошнистою россою уражено 7-22% дерев, 4 – 7% листків, розвиток хвороби 0,2%. **Паршею** уражено 18-22% дерев, 7-9% листків, розвиток хвороби 0,3% та 3-5% дерев, 5-6% плодів, розвиток хвороби 0,2%. **Плодова гниль** поширилась на 1% площ, уразивши 1% плодів.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин у Вінницькій області
(2 декада липня 2026 року)

№ з/п	Назва культури	Обстежено, га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз (сер/макс).									Пошкоджено, (сисними – заселено) рослин, бруньок листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин, бруньок суцвіть, плодів	один. вимір	імаго		яйце		личинки			ентомофаги	серед.	макс.	слабкий (до 25% рослин)	середній (26-50% рослин)	сильний (51% і більше)
							серед.	макс.	серед.	макс.	серед.	макс.	вік						
1	Оз.пшениця	1040	Хлібний жук - кузька	32		екз./кв.м	0,2	0,2							1	1	100		
2	Кукурудза	1210	Стебловий метелик	36	0,5	екз./рослину			15	15	1	1			1	1	100		
			Попелиці	64	3	екз./рослину					9	22			3	7	100		
3	Соняшник	868	Попелиця геліхризова	61	3	екз./рослину	2	2			13	31		2	3	7	100		
			Сліпняки	19		екз./кв.м	1	2							2	3	100		
4	Соя	315	Звичайний павутинний кліщ	18	3	екз./листок					2	3			2	3	100		
			Попелиці	18	3	екз./рослину					2	3			2	3	100		
5	Цукрові буряки	100	Бурякова листкова попелиця	45	3	екз./рослину					8	14			5	9	100		
			Совка гамма	32	3	екз./кв.м					0,3	0,5			3	3	100		
			Щитоноска лободова	46		екз./кв.м	0,3	0,3							3	3	100		
6	Картопля	1	Західний травневий хрущ	60		екз./кв.м					0,3	0,4			1	2	100		
			Колорадський жук	100	22	екз./рослину	2	2			9	20			10	22	100		
			Совка озима	60		екз./кв.м					0,1	0,2			1	1	100		
			Дротяники	60		екз./кв.м					2	2			1	2	100		
7	Капуста	2	Капустяна совка	70	1	екз./рослину					1	2			1	2	100		
			Капустяна попелиця	50	3	екз./рослину					9	18			3	3	100		
			Капустяна міль	70	2	екз./рослину					2	3			2	2	100		
			Білан капустяний	75	2	екз./рослину					2	5			2	3	100		
			Білокрилки	100	33	екз./рослину	18	18			14	46			22	55	100		
8	Огірки	2	Звичайний павутинний кліщ	10	3	екз./листок					2	3			2	3	100		

			Попелиці	10	3	екз./листок	2	3			5	11			2	3	100		
9	Томат	2	Колорадський жук	60	2,5	екз./рослину	1	2			2,5	5			2	3	100		
			Білокрилки	50	30	екз./рослину	10	28							22	30	100		
			Попелиці	50	2	екз./рослину					3	3			2	2	100		
10	Сад	7	Зелена яблунева попелиця	79	11	екз./листок					18	35			6	18	100		
			Звичайний павутинний кліщ	7	10	екз./листок	1	2			2	3			7	12	100		
			Яблунева плодожерка	3	5	екз./плід					1	1			1	2	100		

**Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин
(2 декада липня 2026 року)**

№ з/п	Назва культури	Обсте- жено, га	Назва хвороби	Уражено, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				площ	рослин		Назва ураж. органу	Органів рослин			
					середній	максим.		середній	максим.		
1	Оз.пшениця	1040	Септоріоз колосу	46	3	11	колос			0,2	
			Фузаріоз колосу	8	0,2	0,2	колос			0,1	
2	Кукурудза	1210	Гельмінтоспоріоз	24	1	1	листя			0,1	
			Сажка пухирчаста	20	0,5	0,5	качани			0,1	
3	Соняшник	868	Пероноспороз	47	3	5	(57%), листя(43%)			0,2	
			Біла гниль	82	0,5	0,5	стебло			0,1	
			Фомоз	60	6	14	(45%), листя(55%)			0,2	
4	Соя	315	Альтернаріоз	17	1	2	листя			0,1	
			Аскохітоз	17	3	5	листя			0,2	
			Септоріоз	11	3	3	листя			0,2	
5	Цукрові буряки	100	Фомоз	25	2	3	листя			0,1	
			Церкоспороз	25	2	3	листя			0,1	
6	Картопля	1	Альтернаріоз	100	5	10	листя			0,3	
			Фітофтороз	100	7	15	листя			0,3	
7	Огірки	2	Антракноз	5	2	3	листя			0,2	
			Бактеріоз	55	3	7	листя			0,2	
			Пероноспороз	55	4	5	листя			0,2	
8	Томат	2	Альтернаріоз	70	6	11	листя			0,2	
			Гниль верхівкова	50	18	18	плоди	1	1	0,1	
			Фітофтороз	70	6	8	листя	1	1	0,2	
9	Сад	7	Борошниста роса	100	7	22	листя	4	7	0,2	
			Гниль плодова	1			плоди	1	1		
			Парша	100	18	22	листя	7	9	0,3	
			Парша звичайна плодів	74	17	22	плоди	5	6	0,2	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах
(2 декада липня 2026 року)**

№з/п	Назва культури	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення, %		Середня чисельність яєць на самку
		обстежено	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність, екз		самиці	самці	
							середня	максимальна			
1	Кукурудза	1210	120	Совка гамма	II	екз./ніч	2	2		100	
				Капустяна совка	II	екз./ніч	1	1		100	
				Стебловий метелик	I	екз./ніч	1	1		100	
				Совка бавовникова	II	екз./10 кроків	1	1	100		
2	-	-	-	Совка озима	I	екз./ніч	1	2			
3	-	-	-	Совка оклична	I	екз./ніч	1	1			
4	-	-	-	Совка гамма	II	екз./10 кроків	1	2			
5	-	-	-	Капустяна совка	II	екз./ніч	1	2			
6	-	-	-	Яблунева плодожерка	II	екз./ніч	5	7			
7	-	-	-	Стебловий метелик	I	екз./ніч	1	1			

**Начальник управління
фітосанітарної безпеки**

підписано

Наталія САМБОРСЬКА