



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ФІТОСАНІТАРНОЇ БЕЗПЕКИ**

вул. Келецька, 53, м. Вінниця, 21027, тел. (0432) 65-91-50, 65-86-70
web: www.vingudpss.gov.ua, e-mail: info@vingudpss.gov.ua, код ЄДРПОУ 40310643

№ _____

на № _____

від _____

**Відділ захисту рослин Департаменту
фітосанітарної безпеки та контролю в
рослиництві Держпродспоживслужби України
Департамент агропромислового розвитку
Вінницької ОВА
Вінницький обласний центр з гідрометеорології**

**ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ №10
щодо фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур
у господарствах Вінницької області станом на 06 серпня 2026 року**

Фенологія культур

Соняшник –	цвітіння – закінчення цвітіння	Цукрові буряки –	ріст коренеплодів
Соя –	формування бобів	Картопля	достигання - стиглість
Кукурудза –	молочна стиглість	Яблуня –	ріст – визрівання плодів

Кліматичні умови (за даними Вінницького обласного центру з гідрометеорології)

Упродовж третьої декади липня температурний режим був нижчим за середньобаторічні значення. Проходження атмосферних фронтів обумовило випадання опадів різної інтенсивності та кількості, шуміли грози, місцями відмічався град.

Максимальна температура повітря протягом декади сягала 30-34°, але не перевищила максимальну температуру установлену в третій декаді липня 1995, 2007 та 2015 років 35-40°.

Мінімальна температура повітря протягом декади опускалася до 8-11°, але не була нижчою значень, які відмічалися в третій декаді липня 1996 року (6-8)°.

Сонячне сяйво до поверхні землі надходило протягом 122 годин, при нормі 103 годину.

Середня декадна температура повітря склала 18,4-20,1 ° тепла, що на 1,9-2,4° нижче від норми. Максимальна температура повітря підвищувалася до 30-34°. Мінімальна температура повітря та ґрунту в нічні години опускалася до 8-11°. Станом на 31 липня сума ефективних температур повітря перевищувала норму: вище +5° була в межах 1300-1473°, при нормі 1284-1471°, вище +10° 724-841°, при нормі 715-874°, вище +15° в межах 303-405°, при нормі 258-385°.

Розподіл опадів був нерівномірним. Їх кількість в південних та північно-західних районах області склала 1-5 мм, або 4-18 % від норми, на решті території області 7-19 мм, або 21-70 % від норми, місцями до 34 мм, або 110 % від норми.

Відносна вологість повітря становила 61-70 %, при нормі 70-73 %.

Погодні умови в третій декаді липня в цілому були задовільними для завершення вегетації та обмолоту ранніх зернових культур.

Для продовження вегетації пізніх культур агрометеорологічні умови знаходилися в тісній залежності від кількості опадів і запасів продуктивної вологи. Опади, які випали в останні дні попередньої декади і в цій декаді, забезпечили нерівномірний розподіл запасів ґрунтової вологи та обумовили різні умови для подальшої вегетації пізніх культур.

В південній частині області утримання теплої з малоефективними опадами погоди не поліпило умови вологозабезпеченості рослин.

Такі погодні умови незадовільно впливали на подальшу вегетації пізніх культур, розвиток овочевих культур та росту бульб та коренеплодів.

В окремих господарствах Жмеринського району відмічається пошкодження посівів сояшника градом (24 липня).

Багатоїдні шкідники

Продовжується літ метеликів II-го покоління **підгризаючих** та **листогризучих** совок: за ніч на світлопастку потрапило 2 екз. окличної та 2 екз. озимої совок; 2 екз. капустяної совки за ніч вилову на світло пастку та 1 екз./10 кр. совки-гамма на посівах цукрових буряків. Підготовлено сигналізаційне повідомлення щодо поширення совок II покоління.

Шкідники та хвороби кукурудзи

При обстеженні посівів **кукурудзи** (площа 2598 га) відмічено заселеність 1% рослин гусеницями **кукурудзяного стеблового метелика** на 45% площ з чисельністю – 1 екз. на рослину. Заселеність личинками гусениць **бавовникової совки** становить 2% рослин з чисельністю – 1 екз. на рослину. Заселеність **попелицями** становить 5% рослин на 60% площ із чисельністю 13-51 екз. на рослину, пошкоджено 5-10% рослин у слабкому ступені.

Відмічено захворюваність рослин **гельмінтоспоріозом** на 11% площ у 2-5% рослин, розвиток хвороби – 0,2%. **Суха пухирчаста сажка** спостерігається осередково на 6% площ у 0,5% рослин.

Шкідники та хвороби сояшнику

При обстеженні посівів **сояшнику** (площа 596 га) було виявлено заселення **геліхрізовою попелицею** на 80% площ 3% рослин з чисельністю 16-30 екз. на заселену рослину, **сліпняками** пошкоджено 3-4% рослин з чисельністю 1-2 екз./кв.м. Рослини сояшника заселяють ентомофаги (сонечко семикрапкове) з чисельністю 1:30 (хижак – шкідник).

Відмічено ураження рослин **фомозом** – 5-10 % рослин, **пероноспорозом** – 4-7% рослин, **білою гниллю** - 1% рослин. Розвиток хвороб становить 0,2-0,3%.

Шкідники та хвороби сої

При обстеженні **сої** (330 га) відмічено розвиток аскохітозу, яким уражено 5-7% рослин, розвиток хвороби 0,2%. **Альтернаріозом** уражено 2-5% рослин, **септоріозом** – 3-5% рослин, розвиток хвороб 0,2%. Хвороби відмічено на 25-30% площ.

На 34% площ проходить розвиток **попелиці** та **павутинного кліща**, якими заселено 3-5% рослин, по 3-5 екз./листок. Ступінь пошкодження – слабкий.

Шкідники та хвороби цукрових буряків

При обстеженні посівів **цукрових буряків** (200 га) встановлено поширення **бурякової листкової попелиці** на 63% площ, 4% рослин з чисельністю 11-21 екз./рослину. Личинками **мінуючої молі** заселено 1-2% рослин, осередково виявлено лободову **щитоноску** на 23% площ у кількості 0,2 екз./м².

Відбувається ураження рослин хворобами: на 48% площ **церкоспорозом** та **фомозом** 2-3 % рослин. **Хвостова гниль**, **парша коренеплодів** та **дуплистість** зустрічається на 25% площ у 1% рослин.

Шкідники та хвороби овочів

В посадках **картоплі** (1га) продовжується розвиток та шкідливість **колорадських жуків**: чисельність імаго – 2-3 екз./рослину, личинок – 3-9 екз./рослину, пошкоджено 11-24% рослин в слабкій ступені, яєць нараховується 10-14 екз./рослину. **Грунтовими шкідниками** заселено 70% обстежених площ за чисельності личинок: озима совка – 0,2, травневі хрущі – 0,5-1, дротяники – 2-3 екз./кв.м, пошкодили 1-3% рослин.

Хвороби поширені на 100% площ, однак розвиток мало інтенсивний через високі температури: **фітофторозом** уражено в середньому 9-15% рослин, розвиток хвороби 0,5%, **альтернаріозом** – 7, максимально 15% рослин, розвиток хвороби – 0,5%.

У насадженнях **томатів** (площа 3 га) на 83% площ відмічено ураженість **фітофторозом** 4-6 % рослин з розвитком хвороби 0,2%, **альтернаріозом** 5-7% рослин з розвитком 0,2 %. На 1% плодів відмічено **верхівкову гниль**.

Рослини **огірків** уражено **пероноспорозом** (5 - 11% рослин), **антракнозом** (3-5% рослин), **бактеріозом** (7-18% рослин), розвиток хвороб – 0,3%. Рослини заселяють **попелиці** та **павутинний кліщ** 50% обстежених площ. Попелицями у кількості 6-11 екз./листок та звичайним павутинним кліщем у кількості 2-3 екз./листок заселено/пошкоджено 3-5% рослин.

На посадках **капусти** (1 га) проходить розвиток фітофагів: **капустяна совка** заселила та пошкодила 2% рослин, чисельність 1-2 екз./рослину; **капустяна міль** – 3% рослин, 2-3 екз./рослину; **білани** – 3% рослин, 2 екз./рослину; **попелиці** – 6-9% рослин, 10-22 екз./рослину; **білокрила** – 56% рослин, чисельність імаго 12-48 екз., личинок – 10-36 екз./рослину.

Столові буряки (1га) уражено **фомозом** та **церкоспорозом** на 100% площ, **фомозом** 9-12% рослин, **церкоспорозом** 11-24% рослин, розвиток хвороб 0,3%.

Шкідники та хвороби саду

В плодових насадженнях (площа 6 га) продовжується відродження личинок зеленої яблуневої попелиці: заселено 9% листків, чисельність 15-28 личинок на листок. Яблунева плодожерка відмічена на 8% площ, 6% дерев, за чисельності 1 екз./плід, пошкоджено 2-3% плодів. Бурий плодовим кліщем заселення становить 13% рослин, 2-3 екз./листок, пошкоджено 9-15% рослин,

Продовжується розвиток борошнистої роси та парші, якими охоплено 100% площ. Борошнистою росою уражено 12-24% дерев, 5-9% листків з розвитком хвороби 0,3%. Парша спостерігається на 100% дерев, уражено 18-26% листків; на 58% плодів, уражено 7-10% плодів, розвиток хвороби 0,2-0,3%.

Інформація
щодо поширення і чисельності шкідників сільськогосподарських рослин у Вінницькій області
(1 декада серпня 2026 року)

№ з/п	Назва культури	Обстежено, га	Назва шкідника	Заселено, %		Чисельність, екз (сер/макс).									Пошкоджено, (сисними – заселено) рослин, бруньок, листків, суцвіть, плодів, %		Ступінь пошкодження, %		
				площ	рослин, бруньок суцвіть, плодів	один. вимір	імаго		яйце		личинки			ентомофаги					
							серед.	макс.	серед.	макс.	серед.	макс.	вік		серед.	макс.			
1	Кукурудза	2598	Стебловий метелик	45	1	екз./рослину					1	1			1	2	100		
			Совка бавовникова	6	2	екз./рослину					1	1			2	2	100		
			Попелиці	60	5	екз./рослину					13	51			5	10	100		
2	Соя	330	Звичайний павутинний кліщ	34	5	екз./листок					3	3			3	5	100		
			Попелиці	34	5	екз./рослину					3	5			3	5	100		
3	Цукрові буряки	200	Бурякова листкова попелиця	63	4	екз./рослину					11	21			4	9	100		
			Бурякова мінуюча міль	25	2	екз./рослину					1	2			2	2	100		
			Совка гамма	54	4	екз./кв.м					0,5	0,5			3	4	100		
			Щитоноска лободова	23		екз./кв.м					0,2	0,2			1	2	100		
4	Соняшник	596	Попелиця геліхризова	80	3	екз./рослину					16	30		1	3	9	100		
			Сліпняки	17		екз./кв.м	1	2							3	4	100		
5	Картопля	1	Західний травневий хрущ	70		екз./кв.м					0,5	1			2	2	100		
			Колорадський жук	100	12	екз./рослину	2	3	10	14	3	9			11	24	100		
			Совка озима	70		екз./кв.м					0,2	0,2			1	2	100		
			Дротяники	70		екз./кв.м					2	3			2	3	100		
6	Капуста	1	Капустяна совка	50	2	екз./рослину					1	2			2	2	100		
			Капустяна попелиця	100	6	екз./рослину					10	22			6	9	100		
			Капустяна міль	50	3	екз./рослину					2	3			3	3	100		

			Білани	60	3	екз./рослину					2	2			3	3	100		
			Білокрилки	100	56	екз./рослину	12	48			10	36			45	100	100		
7	Огірки	1	Звичайний павутинний кліщ	50	4	екз./листок					2	3			3	5	100		
			Попелиці	50	4	екз./листок					6	11			3	5	100		
8	Томат	3	Колорадський жук	7	4	екз./рослину	1	2							3	5	100		
			Білокрилки	33	42	екз./рослину	14	28							25	42	100		
9	Сад	6	Зелена яблунева попелиця	63	9	екз./листок					15	28			6	20	100		
			Яблунева плодожерка	8	6	екз./плід					1	1			2	3	100		
			Кліщ бурий плодовий	63	13	екз./листок	1	2			2	3			7	15	100		

**Інформація
щодо ураження хворобами сільськогосподарських рослин
(1 декада серпня 2026 року)**

№ з/п	Назва культури	Обсте- жено, га	Назва хвороби	Уражено, %						Розвиток хвороби, %	Загинуло рослин, %
				площ	рослин		Назва ураж. органу	Органів рослин			
					середній	максим.		середній	максим.		
1	Кукурудза	2598	Гельмінтоспоріоз	11	2	5	листя			0,2	
			Сажка пухирчаста	6	0,5	0,5	качани			0,1	
2	Соя	330	Альтернаріоз	30	2	5	листя			0,2	
			Аскохітоз	30	5	7	листя			0,2	
			Септоріоз	25	3	5	листя			0,2	
3	Цукрові буряки	200	Гниль хвостова	25	1	1	коріння				
			Парша звичайна	25	1	1	коріння				
			Фомоз	48	2	3	листя			0,2	
			Церкоспороз	48	2	3	листя			0,2	
			Дуплистість	25	1	1	коріння				
4	Соняшник	596	Гниль біла	42	1	1	стебла				
			Пероноспороз	63	4	7	листя			0,2	
			Фомоз	72	5	10	листя			0,3	
5	Картопля	1	Альтернаріоз	100	7	15	листя			0,5	
			Фітофтороз	100	9	15	листя			0,5	
6	Огірки	1	Антракноз	20	3	5	листя			0,3	
			Бактеріоз	100	7	18	листя			0,3	
			Пероноспороз	40	5	11	листя			0,3	
7	Томат	3	Альтернаріоз	83	5	7	листя			0,2	
			Гниль верхівкова	83	9	12	плоди	1	1	0,1	
			Фітофтороз	83	4	6	листя			0,2	
8	Столові буряки	1	Фомоз	100	9	12	листя			0,3	
			Церкоспороз	100	11	24	листя			0,3	
9	Сад	6	Борошниста роса	100	9	24	листя	5	9	0,2	
			Гниль плодова	5			плоди	2	3		
			Парша	100	18	26	листя	9	12	0,3	
			Парша звичайна плодів	58	15	26	плоди	7	10	0,2	

**Інформація
щодо льоту метеликів лускокрилих комах
(1 декада серпня 2026 року)**

№з/п	Назва культури	Площа, га		Шкідник		Інтенсивність льоту			Співвідношення, %		Середня чисельність яєць на самку
		обстежено	заселено	назва	покоління	Одиниця обліку	Чисельність, екз		самиці	самці	
							середня	максимальна			
1	Цукрові буряки	200	50	Совка гамма	II	екз./10 кроків	1	1	100		
2	-	-	-	Совка озима	II	екз./ніч	1.5	2		100	
3	-	-	-	Совка оклична	II	екз./ніч	1.5	2		100	
4	-	-	-	Совка гамма	II	екз./10 кроків	1	2			
5	-	-	-	Капустяна совка	II	екз./ніч	1.5	2		100	
6	-	-	-	Яблунева плодожерка	II	екз./ніч	1	3			
7	-	-	-	Стебловий метелик	I	екз./ніч	1	1			

**Начальник управління
фітосанітарної безпеки**

підписано

Наталія САМБОРСЬКА